

# FLYNT ÖKO

Für Flexibilität in der Fruchtfolge

ca. S 110 | ca. K 130



AUCH IM  
NORDEN

## Profil

Die DSV setzt mit FLYNT ÖKO einen neuen Maßstab in Sachen Frühreife. Zusätzlich bietet diese Sorte eine weitere Nutzungsoption als Körnermais. Versuche haben gezeigt, dass FLYNT ÖKO einen Kornertrag von 6,8 t/ha erreichen kann. Aufgrund des ebenfalls hohen Hartmaisanteils und der schnellen Jugendentwicklung kann diese Sorte flexibel in verschiedenste Fruchtfolgen integriert werden.

- ✓ Sehr schnelle Jugendentwicklung
- ✓ Hoher Stärkegehalt
- ✓ Früh- und spätsaatgeeignet



Allgemein

|                 |                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nutzung         |   |  |
| Siloreife       | ultrafrüh                                                                                                                                                           |  |
| Körnerreife     | ultrafrüh                                                                                                                                                           |  |
| Siloreifezahl   | ca. 110                                                                                                                                                             |  |
| Körnerreifezahl | ca. 130                                                                                                                                                             |  |
| Korntyp         | Ha / Hartmais                                                                                                                                                       |  |
| Hybridform      | Dreiweghybride                                                                                                                                                      |  |
| Aussaattermin   | <div><div>früh</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>spät</div></div>                                  |  |

Agronomische Eigenschaften

|                                    |                                                                                                                   |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pflanzenlänge                      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>(5)</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel)                 |
| Kälteempfindlichkeit in der Jugend | <div><div></div><div>(2)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (sehr gering bis gering) |

Neigung zu

|                       |                                                                                                                   |                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bestockung            | <div><div></div><div></div><div>(3)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering)                 |
| Lager (Körnernutzung) | <div><div></div><div>(2)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (sehr gering bis gering) |
| Lager (Silonutzung)   | <div><div></div><div>(2)</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (sehr gering bis gering) |

## Ertragseigenschaften

|                    |                                                                                                                 |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gesamttrockenmasse | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>6</div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel bis hoch) |
| Energieertrag      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel)          |
| Stärkegehalt       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>6</div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel bis hoch) |
| Verdaulichkeit     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel)          |
| Kornertrag         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>5</div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (mittel)          |

## Anfälligkeiten

|              |                                                                                                                 |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stängelfäule | <div><div></div><div></div><div>3</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | (gering) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Resistenzen gegenüber Krankheiten

|                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beulenbrand                                                            | <div><div>+</div><div>+</div><div></div></div> |
| Helminthosporium tritici-repentis = DTR<br>Drechslera tritici-repentis | <div><div>+</div><div></div><div></div></div>  |

## Standort

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenzlagen   | ✓                                                                                                                            |
| Bodenart     | <div><div>schwer</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>leicht</div></div>  |
| Feuchtigkeit | <div><div>feucht</div><div></div><div></div><div></div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div>trocken</div></div> |

## Aussaat

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Silomais   | 10 - 12 Pfl./m <sup>2</sup> |
| Körnermais | 9 - 11 Pfl./m <sup>2</sup>  |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und

Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2024, Änderungen vorbehalten.